

TABLEAU DES TRANSMISSIONS DES IST

Ce tableau récapitule les pratiques à risques pour chaque Infection Sexuellement Transmissible (IST).

| | PÉNÉTRATION VAGINALE | PÉNÉTRATION ANALE | FELLATION | CUNNILINGUS | ANULINGUS | CARESSSE SEXUELLE | EMBRASSER | ÉCHANGE SERINGUE | SNIFF | MÈRE/ ENFANT |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------|--------------|
| VIH/SIDA | ● | ● | ○*** | ○ | | ● | | ● | | ● |
| HÉPATITE A | | ● | | | ● | | | | | |
| HÉPATITE B | ● | ● | ● | ● | | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| HÉPATITE C | ● | ● | | | | ● | | ● | ○ | ○ |
| SYPHILIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● |
| HERPÈS GÉNITAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● |
| HPV* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ○ |
| CHLAMYDIA | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● |
| GONORRHÉE | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | ● |
| TRICHOMONAS | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● |

○ RISQUE FAIBLE ○ RISQUE MOYEN ● RISQUE ÉLEVÉ ●** RISQUE AVEC DU SANG

* Human PapillomaVirus

** Lors de rapports sexuels non protégés et/ou traumatiques incluant la présence de sang (fisting, règles, lésions, etc.)

*** La personne faisant la fellation court un risque faible si elle reçoit du sperme en bouche et que ses muqueuses sont abîmées