

TABLEAU DES DÉLAIS DES IST

En l'absence de symptômes, il faut parfois un certain temps pour que les dépistages puissent détecter une IST. Avant de pouvoir faire un dépistage, consultez ce tableau pour savoir combien de temps il est recommandé d'attendre après une possible contamination.

	PRISE DE RISQUE	7 JOURS	2 SEMAINES	6 SEMAINES	2 MOIS 8 SEMAINES	3 MOIS 12 SEMAINES	AU-DELÀ DE 3 MOIS
VIH/SIDA	/			PRISE DE SANG		TEST RAPIDE/AUTO-TEST	
HÉPATITE A							
HÉPATITE B							
HÉPATITE C						PRISE DE SANG TEST RAPIDE	
SYPHILIS				PRISE DE SANG		TEST RAPIDE	
HERPÈS GÉNITAL*							
HPV**							
CHLAMYDIA							
GONORRHÉE							
TRICHOMONAS							

Herpès* : Le diagnostic de l'herpès est possible uniquement en cas de symptômes.

HPV ** Concernant le papillomavirus : l'apparition des symptômes peut se faire des mois, voire des années après la première contamination ! Pour l'utérus, le/la gynécologue fait systématiquement un frottis (remboursé) tous les 3 ans ou s'il/elle constate des lésions. Pour l'anus et le pénis, un dépistage ne sera fait qu'en cas de symptômes apparents.