

TABLEAU DES DÉLAIS DE DÉPISTAGE DES IST

	PRISE DE RISQUE	7 JOURS	2 SEMAINES	6 SEMAINES	2 MOIS 8 SEMAINES	3 MOIS 12 SEMAINES	AU-DELÀ DE 3 MOIS
VIH/SIDA				PRISE DE SANG		TEST RAPIDE/AUTO-TEST	
HÉPATITE A							
HÉPATITE B							
HÉPATITE C						PRISE DE SANG TEST RAPIDE	
SYPHILIS				PRISE DE SANG		TEST RAPIDE	
HERPÈS GÉNITAL*							
PAPILLOMAVIRUS**							
CHLAMYDIA							
GONORRHÉE							
TRICHOMONAS							

Herpès* : Le diagnostic de l'herpès est possible uniquement en cas de symptômes.

HPV ** Concernant le papillomavirus : l'apparition des symptômes peut se faire des mois, voire des années après la première contamination ! Pour le col de l'utérus, un frottis est recommandé et gratuit/remboursé régulièrement, renseigne toi auprès de ta/on médecin ou gynéco.

PLUS D'INFOS SUR
WWW.DEPISTAGE.BE



TABLEAU DES TYPES DE DÉPISTAGE PAR IST

PRÉLÈVEMENT SANGUIN		EXAMEN MÉDICAL		
PRISE DE SANG	TEST À RÉSULTAT IMMÉDIAT	SIGNES CLINIQUES	PRÉLÈVEMENT (FROTTIS, ...)	PRÉLÈVEMENT URINAIRE
VIH/SIDA	VIH/SIDA			
HÉPATITE A				
HÉPATITE B				
HÉPATITE C	HÉPATITE C			
SYPHILIS	SYPHILIS	SYPHILIS		
		HERPÈS GÉNITAL		
		HPV/PAPILLOMAVIRUS	HPV/PAPILLOMAVIRUS	
		CHLAMYDIA	CHLAMYDIA	CHLAMYDIA
		GONORRHÉE	GONORRHÉE	GONORRHÉE
		TRICHOMONAS	TRICHOMONAS	

